



! เตือนภัย !

แมงกะพรุนหัวขวด



ในช่วงระหว่าง เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี เป็นช่วงการระบาดของ แมงกะพรุนหัวขวด *Physalia* sp. หรือเรียกว่า

- Portuguese man-of-war (โปตุเกีส แมน ออฟ วอ)
- Bluebottle (บลูบอทเทิล)

จัดเป็นแมงกะพรุนชนิดที่มีพิษร้ายแรง โดยพิษของแมงกะพรุนหัวขวด จะทำลายระบบประสาท ผิวหนัง หัวใจ **เมื่อเจอแมงกะพรุนชนิดนี้ ห้ามจับ หรือ สัมผัสโดยเด็ดขาด** ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยทันทีเพราะเมื่อสัมผัสจะมีอาการปวดแสบปวดร้อน อาการหลังการโดนพิษ อาจทำให้ช็อคและหัวใจล้มเหลวได้ แต่ระดับความเป็นพิษสามารถทำให้บาดเจ็บได้ในหลายระดับขึ้นอยู่กับความต้านทานของแต่ละบุคคล และปริมาณพิษที่ได้รับ




ขั้นตอน 
การปฐมพยาบาล
ผู้ที่สงสัย?
ถูกแมงกะพรุนพิษ

อาการไม่รุนแรง



ถ้าผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวดี



บริเวณที่ถูกแมงกะพรุนราดน้ำส้มสายชูให้ทั่วถึง 30 วินาที (ห้ามราดด้วยน้ำจืด) สังเกตอาการ




กลับบ้านได้

อาการรุนแรง



ถ้าผู้บาดเจ็บหมดสติ ไม่หายใจ ให้ทำการปั๊มหัวใจ หรือ CPR ทันที  1669



บริเวณที่ถูกแมงกะพรุนราดน้ำส้มสายชูให้ทั่วถึง 30 วินาที (ห้ามราดด้วยน้ำจืด) ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น จนกว่ารถพยาบาลจะมาถึงหรืออาการดีขึ้น



รับนำส่งโรงพยาบาล



สังเกตอาการอย่างน้อย 45 นาที ว่ามีอาการต่อไปนี้หรือไม่ 1 ข้อ หรือไม่มีให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน



ปวดมากบริเวณบาดแผล หลัง ลำตัว หรือศีรษะ



กระสับกระส่าย หรือสับสน เหงื่อออกมาก ขนลุก คลื่นไส้ หรืออาเจียน



หายใจลำบาก หายใจเร็ว หรือ หอบเหนื่อย ใจสั่น เจ็บหน้าอก หรือ แน่นหน้าอก



หน้าซีด หรือ ปลายมือปลายเท้าเขียว

ขอเน้นย้ำพี่น้องประชาชน
เมื่อเจอแมงกะพรุนชนิดนี้
ห้ามจับ หรือ สัมผัส
โดยเด็ดขาด !
DON'T TOUCH !



ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



0-7430-7079



smcrc@dmcr.mail.go.th